© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

und nun durch denselben weiter nördlich geht; bald befindet man sich in einem schmalen, von drei Seiten von bewaldeten Basalthöhen gänzlich umfassten länglichen Kessel, einem gottverlassenen Plätzchen, das nur nach Norden sich wieder nach aussen schmal öffnet — eine Basaltspalte, um welche amphitheatralisch der Basalt in Blöcken, besonders grotesk auf der Ostseite, angehäuft ist. Ehedem war die Spalte wohl ganz mit Wasser erfüllt, was wenigstens der Name Altsee andeutet; durch Einschwemmung von verwittertem Basalt und durch von den Rändern allmälig zunehmende Pflanzenansiedelung engte sich die Wasseransammlung auf einen ziemlich kleinen, von Torfmoos etc. bewachsenen. immer noch ziemlich tiefen Tümpel ein, einen Zufluss von Wasser konnte ich nicht finden. Mit einem an einer sehr langen Stange befindlichen Drahtnetze ausgerüstet, suchte ich der Molluskenfauna, die hier so abgeschieden von der übrigen Welt sich entwickelt hatte, habhaft zu werden. Der Tümpel enthält:

Limnaeus pereger Müller, nicht häufig.

Calyculina lacustris Müller und

Pisidium obtusale C. Pfeiffer in grosser Menge — gewiss eine recht kümmerliche Fauna. Eine der Oberhaut beraubte leere Helix nemoralis war die einzige Spur eines Weichthieres zwischen den Basaltblöcken.

Bei Eckhardtsroth 1 Stunde südöstlich fand ich im raschfliessenden Bache Pisidium fossarinum Cless.

Diagnoses Clausiliarum novarum Graeciae

auctore

Dr. O. Boettger.

Clausilia (Albinaria) Thiesseae n. sp.

T. breviter rimata, subventrioso-fusiformis, sordide albida, indistincte dilute griseo tesselata, opaca; spira brevis, elongato-conica, superne fuscescens; apex acutiusculus,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

nitidus. Anfr. 9 convexi, sutura distincta, profunda disjuncti, exceptis 2 primis suboblique stricteque densissime costulato-striati, costulis tenuibus, acutis, filiformibus, ultimus subaltus, subdecrescens, a lateribus compressus, sed dorso convexiusculus, vix sulcatus, basi obsolete cristatus, paulum distantius, sed non validius costulatus ac penultimus, costulis plerumque bifidis. Apert. regulariter ovata, superne subangulata, margine dextro et basali circulari, intus fuscula, sinulo mediocri, subangulato; perist. continuum, valde solutum, infundibuliformi-expansum, reflexiusculum, sublabiatum et sub sinulo dentiformi-incrassatum. Lamellae non marginales, intus conniventes; supera verticalis, longiuscula sed humilis, lam. spiralem disjunctam postice transgrediens; infera mediocris, e basi crassiuscula sigmoidea oblique ascendens; lam. parallela tenuis, distinctissima et longissima; subcolumellaris strictiuscula oblique modo intuenti conspicua, non emersa. Suturalis subdistincta; principalis parva, tenuis, lunellam intus vix transgrediens; lunella subdorsalis, recta, latiuscula, superne angulatim recurva, principalem non attingens; palatales nullae. Clausilium apice oblique intuenti conspicuum. — Alt. 11—12, lat. $2^3/_4$—3; alt. apert. 3, lat. apert. $2^1/_4$ mm.

Hab. in Acarnania (leg. ill. Dr. Theod. Krueper Atheniensis).

Forma et statura maxime affinis *Claus. profugae Charp.*, sed minor, anfr. convexioribus, densissime costulato-striatis, lamellaque infera non subhorizontali sed evidenter oblique ascendente.

Clausilia (Albinaria) compressa P. var. calcarea m.

Differt a typo testa albida unicolore, nitente, sutura non marginata, costulis minus acutis, distantioribus, carinis cervicis ut videtur minus conniventibus. — Alt. $15^1/_2$, lat. $3^3/_4$; alt. apert. $3^1/_2$, lat. $2^2/_3$ mm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hab. rarissima in insula Cerigo (leg. ill. Joséphine Thiesse Negropontina).

Clausilia (*Papillifera*) *Josephinae n. sp.*

T. arcuato-subrimata, regulariter fusiformis, isabellino-rufescens, opaca; spira superne attenuata; apex obtusiusculus, nitidus. Anfr. 9—10 vix convexiusculi, sutura submarginata disjuncti, exceptis 2 primis distincte dense striati, striis filiformibus, obliquis, strictis, albescentibus, ultimus a latere compressus, basi subsulcatus et leviter bicristatus, crista exteriore validiore, non validius striatus ac penultimus. Apert. subquadrato-rotundata, superne subangulata; perist. continuum, magis solutum quam in Cl. thermopylarum, sublabiatum, fusculum. Lamellae uti in Cl. thermopylarum, sed lam. infera distinctius furcata, a basi intuenti fere recto angulo recurva et in faucibus lam. superae magis parallela. Principalis lunellam strictiorem, superne angulatim recurvam attingens, maculam albam triangularem sub sutura sitam intus distincte transgrediens; palatalis infera distincta, e basi lunellae exiens, lam. subcolumellari subparallela. — Alt. 17—19, lat. 4—4½; alt. apert. 4½, lat. apert. fere 4 mm.

Hab. Desphinae prope Delphos Parnassis (leg. ill. Joséphine Thiesse).

Species affinis *Claus. thermopylarum P.*, sed anfr. valide striatis, ultimo distinctius bicristato, plica palatali infera e lunella exeunte conspicua distinguenda.

Clausilia (*Idyla*) *thessalonica* (*Friv.*) *K. var. euboica m.*

T. typo major, ventriosior, tenuis, subpellucida, olivaceo-fusca, albo-strigillata, anfr. ultimo distantius costulato, basi distinctius subbicristato, cristis magis parallelis; apert. latiore, late piriformi; perist. fere acuto, non labiato, pliculis parum validis instructo, concolore.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Plicae suturalis, principalis, palatales supera inferaque longissimae et distinctissimae. — Alt. $15^1/_4$, lat. 4; alt. apert. $3^1/_2$, lat. apert. 3 mm.

Hab. prope urbem Sanctae Annae insulae Euboeae septemtrionalis (leg. ill. Joséphine Thiesse).

Habitu coloreque affinis *Claus. denticulatae Oliv.*, sed magis fusiformis et apparatu claustrali valde diversa.

Clausilia (Idyla) thessalonica (Friv.) K. var. crassilabris m.

T. typo multo major, plerumque gracilior, distinctius strigillata, apert. peristomate valde incrassato-calloso coarctata. Palatales supera inferaque satis longae. — Alt. $16^1/_2$—19, lat. $3^3/_4$ - 4; alt. apert. 4, lat. apert. $3^1/_2$ mm.

Hab. prope vicum Palaeo-Asvestos Thessaliae meridionalis (leg. ill. Joséphine Thiesse).

Habitu quasi *Claus. plicatae Drap. var. coarctatae A. Schm.*

Clausilia (Oligoptychia) Castalia Roth var. pirostoma m.

Differt a typo t. multo minore, albostrigillata, apert. magis piriformi, basi distinctius canaliculata, perist. sub sinulo magis incrassato, lam. infera intus furcata, magis horizontaliter in partem sinistram aperturae prosiliente. — Alt. 12—$12^1/_2$, lat. $2^3/_4$ – 3; alt. apert. $2^3/_4$, lat. apert. $2^1/_8$ mm.

Hab. in insula Corfu (?) teste ill. Dr. Theod. Krueper, qui hanc varietatem exiguam benigne mihi communicavit.

Literaturbericht.

Procès-Verbaux des Séances de la Société Malacologique de Belgique, 2 Août 1879.

p. LXVII. *van den Broeck*, Compte-Rendu de l'excursion faite à Anvers les 27 et 28 Juillet 1879 par la Société Malacologique de Belgique. (Vorwiegend paläontologisch).

Mabille, Jules. Testaceorum novorum Europaeorum diagnoses. — In Guide du Naturaliste. No 3.

Als neu beschrieben werden: Limnaea anglica von Manchester, ferner folgende corsische Helices: Hel. acropachia und lenelaia